

Avertissements agricoles



GRANDES CULTURES

BULLETIN TECHNIQUE N° 5 DU 23 MARS 1990



BETTERAVES

PROTECTION AU SEMIS

Les premiers semis ont déjà été effectués notamment en terres légères. Nous vous rappelons l'efficacité des insecticides appliqués au semis contre les principaux ravageurs souterrains et aériens.

→ Cf. Tableau page 2

Attention : RISQUE JAUNISSE AUSSI IMPORTANT QU'EN 1989

Compte-tenu de la douceur hivernale, de l'absence de gel, les populations de pucerons se sont maintenues sous forme d'aptères sur divers hôtes (adventices, silos de betteraves, etc ...). D'importants réservoirs à virus ont pu se reconstituer.

Les conditions sont comparables à celles de 1989 à la même époque. Dans ce contexte, les premiers vols de pucerons vecteurs de jaunisses risquent d'être très précoces.

→ Cf. courbes de piègeage pucerons 1989 - bulletin n° 2 du 9 février 1990

NOUS DEVONS RESTER TRES VIGILANTS :

**UNE PREMIERE INTERVENTION POURRAIT ETRE RAPIDEMENT
NECESSAIRE SUR LES PARCELLES NON PROTEGEES TEMIK OU
DACAMOX**

**⇒ NOUS VOUS TIENDRONS INFORMES DE L'ARRIVEE DES
PREMIERS PUCERONS**

7228



MINISTERE DE L'AGRICULTURE - D.R.A.F.
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE : - Avertissements Agricoles - Laboratoire.
rue Bernard Palissy B.P. 47- 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

Abonnement
annuel :
à l'ordre 190.00 F
Régisseur de Recettes
D.R.A.F. Nord Pas-de-Calais
ISSN 0758-7988 - CPPAP n° 1865 AD

EFFICACITE DES INSECTICIDES APPLIQUES AU SEMIS SUR BETTERAVE

SPECIALITES COMMERCIALES	DOSE / HA	SYSTEMIQUE		EFFICACITE					
		Oui	Non	Ravageurs souterrains					Ravageurs aériens
				Néma- tode	Taupin	Blaniule scuti- gerelle	Tipule	Atomaire	
MICROGRA- NULES	TEMIK G	x (2)		x	x	xx	xxx	x	xxx
	DACAMOX 5 S	x (2)			x	xx	x	x	xxx
	CURATER) (1) DELEX)	x			xx	xxx	xxx	xxx	x(x)(3)
	CARMA	x			xx	xxx	*	*	* (3)
	COUNTER PLUS	x			xxx	xxx	xx	xxx	x
	DELTANET	x			xx	xxx	xxx	xxx	x(3)
	MARSHAL FORT	x			xxx	xx	xx	xxx	x(3)
	ONCOL	x			xx	xx	xx	xxx	x(3)
	GARVOX 3 G		x		xx	xxx		xx	
	DOTAN		x		xxx	xxx		x	
PULVERISA- TION LIQUI- DE ET INCOR- PORATION	LORSBAN				xx	xx	x	x	
	KREGAN				xx	xx	x	x	
	lindane (nombreuses spé- cialités)				xx				
TRAITEMENTS DE SEMENCE	FORCE TS 4		x		xx	xx	x	xx	
	FORCE TS 12		x		xxx	xxx	x	xxx	
ASSOCIATIONS	TEMIK + lindane	x		x	xx	xx	xxx	x	xxx
	DACAMOX + lindane	x			xx	xx	x	x	xxx
	TEMIK + FORCE TS 4 g	x		x	xx	xx(x)	xxx	xx	xxx

(1) et autres spécialités à base de carbofuran

(2) longue rémanence 50 à 70 jours

(3) trop faible rémanence pour assurer une bonne efficacité aphicide en début de végétaux

Efficacité : ☐ Nulle ; x Moyenne ; xx Bonne ; xxx Très bonne ; * Produit nouveau \Rightarrow nécessite complément d'information